

СООБЩЕНИЯ  
ХАРЬКОВСКОГО  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
ВТОРАЯ СЕРИЯ, ТОМЪ XIII, 1913

Comm. Soc. Math. Kharkov.

Vol. 13, p. 1-2, 1912/13.

Démonstration du théorème de Weierstrass fondée sur  
le calcul des probabilités.

Je me propose d'indiquer une démonstration fort simple du théorème suivant de Weierstrass:

*Si  $F(x)$  est une fonction continue quelconque dans l'intervalle  $01$ , il est toujours possible, quel que petit que soit  $\varepsilon$ , de déterminer un polynome  $E_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$  de degré  $n$  assez élevé, tel qu' on ait*

$$|F(x) - E_n(x)| < \varepsilon$$

*en tout point de l'intervalle considéré.*

A cet effet, je considère un événement  $A$ , dont la probabilité est égale à  $x$ . Supposons qu'on effectue  $n$  expériences et que l'on convienne de payer à un joueur la somme  $F\left(\frac{m}{n}\right)$ , si l'événement  $A$  se produit  $m$  fois. Dans ces conditions, l'espérance mathématique  $E_n$  du joueur aura pour valeur

$$E_n = \sum_{m=0}^{n=n} F\left(\frac{m}{n}\right) \cdot C_n^m x^m (1-x)^{n-m}. \quad (1)$$

Or, il résulte de la continuité de la fonction  $F(x)$  qu'il est possible de fixer un nombre  $\delta$ , tel que l'inégalité

$$|x - x_0| \leq \delta$$

entraîne

$$\left| F(x) - F(x_0) \right| < \frac{\varepsilon}{2};$$

de sorte que, si  $\overline{F}(x)$  désigne le maximum et  $\underline{F}(x)$  le minimum de  $F(x)$  dans l'intervalle  $(x - \delta, x + \delta)$ , on a

$$\overline{F}(x) - F(x) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad F(x) - \underline{F}(x) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2)$$

Soit de plus  $\eta$  la probabilité de l'inégalité  $\left| x - \frac{m}{n} \right| > \delta$ , et  $L$  le maximum de  $|F(x)|$  dans l'intervalle 01.

On aura alors

$$\underline{F}(x) \cdot (1 - \eta) - L \cdot \eta < E_n < \bar{F}(x) \cdot (1 - \eta) + L \cdot \eta. \quad (3)$$

Mais, en vertu du théorème de Bernoulli, on pourra prendre  $n$  assez grand pour avoir

$$\eta < \frac{\varepsilon}{4L}. \quad (4)$$

L'inégalité (3) se mettra donc successivement sous la forme

$$F(x) + (\underline{F}(x) - F(x)) - \eta(L + \underline{F}(x)) < E_n < F(x) + (\bar{F}(x) - F(x)) + \eta(L - \bar{F}(x))$$

et ensuite

$$F(x) - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{2L}{4L} \varepsilon < E_n < F(x) + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2L}{4L} \varepsilon;$$

donc

$$|F(x) - E_n| < \varepsilon \quad (5)$$

Or  $E_n$  est manifestement un polynôme de degré  $n$ .

Le théorème est donc démontré.

J'ajouterai seulement deux remarques.

Les polynômes approchés  $E_n(x)$  sont surtout commodes, il me semble, lorsqu'on connaît exactement ou approximativement les valeurs de  $F(x)$

pour  $x = \frac{m}{n}$  ( $m = 0, 1, \dots, n$ ).

La formule (1) et l'inégalité (5) montrent que, quelle que soit la fonction continue  $F(x)$ , on a

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^{m=n} F\left(\frac{m}{n}\right) \cdot C_n^m x^m (1-x)^{n-m}.$$

*S. Bernstein.*